

Segments de femmes enceintes exposées au risque de paludisme

		Segment 1	Segment 2	Segment 3	Segment 4	Segment 5
		Modernistes Actives	Informées Sereines	Prudentes Modérées	Nouvelles Mères Hésitantes	Majoritairement Réticentes
COMPORTEMENTS CLÉS	Fréquentation des CPN	5+ visites	1-4 ANC visites	1-4 ANC visites	0-4 ANC visites	Assiste rarement aux CPN
	Adhésion au TPIg	L'adhésion est modérée	L'adhésion reste faible à modérée	L'adhésion reste faible à modérée	L'adhésion reste faible à modérée	Peu enclins à recevoir ou à prendre le TPIg
LES FACTEURS CLÉS QUI DÉTERMINENT LES COMPORTEMENTS	Perception des prestataires	Majoritairement positive	Majoritairement positive	Croit qu'elle sera renvoyée sans son conjoint	Pense qu'elle ne sera pas traitée avec respect	Neutre
	Confiance dans les MII et les traitements	Élevée	Élevée	Élevée	Moyennement élevée	Modérée
	Discussion avec le partenaire ou la famille	Discuter des CPN avec le conjoint	Discute sporadiquement des CPN avec son conjoint	Discute longuement des CPN et décide conjointement avec le conjoint	Décide seul ou est influencé par un membre de la famille	Moins susceptibles de discuter des CPN avec leur conjoint
	Normes sociales	Croient que les autres femmes se rendent à plus de 4 visites de CPN	Estime que les femmes devraient attendre avant de se rendre aux consultations prénatales	Pense que peu de femmes se rendent à plus de 4 visites de CPN	Croient que les autres femmes se rendent à plus de 4 visites de CPN	Pense que peu de femmes se rendent à plus de 4 visites de CPN
	Perception du risque	Pense que le paludisme est une menace modérée	Pense que le paludisme est une menace modérée	Pense que le paludisme est facile à traiter et ne constitue pas une menace	Pense que le paludisme est une menace modérée	Pense que le paludisme est une menace modérée